

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТА НА СОДЕРЖАНИЕ МОЧЕВИНЫ В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ (UBT) (Для диагностики инфекции *Helicobacter pylori*)

Не принимайте следующие лекарства в течение 4 недель до обследования:

- **АНТИБИОТИКИ**
- **ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОГО НАСОСА** (Мепрал, Антра, Омепразен, Лосекс, Лимпидекс, Лансокс, Панторк, Пептазол, Пантекта, Аксагон, Нексий, Эзопрал, Люцен)
- **АНТАГОНИСТЫ H2 в полной дозировке** (Ранидил 300, Зантак 300, Ранибен 300, Ульчекс 300, Гастин 40, Фамодил 40, Мотиакс 40, Гасталгил 150, Низакс 300)
- **РАНИТИДИН В ЧИСТОЙ ФОРМЕ** (пилорид, геликодил)

Не принимайте следующие лекарства за неделю до обследования:

- **АНТАГОНИСТЫ H2 в половинной дозировке** (Ранидил 150, Зантак 150 и т.д., см. выше)
- **СУКРАЛЬФАТ** (Сукральфин, Сукрамал, Гастрогель, Цитогель, Антепсин)

В день исследования:

- **ГОЛОДАНИЕ** в течение не менее 3 часов
- **НЕ КУРИТЬ**

Пациент может принимать следующие лекарства за несколько дней до обследования:

- **ПРОКИНЕТИКИ** (плазил, перидон, мотилиум, мотилекс, левопрейд, левобрен)
- **АНТАЦИДЫ** (Маалокс, Риопан, Глиптид, Гевискон и Гавискон Адванс)