

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'UREA BREATH TEST (UBT) (Per la diagnosi di infezione da Helicobacter pylori)

Nelle 4 settimane precedenti l'esame non assumere i seguenti farmaci:

- **ANTIBIOTICI**
- **INIBITORI DI POMPA PROTONICA** (Mepral, Antra, Omeprazen, Losec, Limpidex, Lansox, Pantorc, Peptazol, Pantecta, Axagon, Nexium, Esopral, Lucen)
- **H2 ANTAGONISTI a dose piena** (Ranidil 300, Zantac 300, Raniben 300, Ulcex 300, Gastrin 40, Famodil 40, Motiax 40, Gastralgil 150, Nizax 300)
- **RANITIDINA DISMUTATA** (Pylorid, Elicodil)

Nella settimana precedente l'esame non assumere i seguenti farmaci:

- **H2 ANTAGONISTI a metà dose** (Ranidil 150, Zantac 150 etc...vedi sopra)
- **SUCRALFATO** (Sucralfin, Sucramal, Gastrogel, Citogel, Antepsin)

Il giorno dell'esame:

- **DIGIUNI da almeno 3 ore**
- **NON AVER FUMATO**

Il paziente PUO' assumere nei giorni prima dell'esame i seguenti farmaci:

- **PROCINETICI** (Plasil, Peridon, Motilium, Motilex, Levopraid, Levobren)
- **ANTIACIDI** (Maalox, Riopan, Gliptide, Gaviscon e Gaviscon Advanced)